

核准日期: 2007年01月26日  
修改日期: 2019年03月29日



## 维A酸片说明书


请仔细阅读说明书并在医师指导下使用。

### 【药品名称】

通用名称: 维A酸片  
英文名称: Tretinoin Tablets  
汉语拼音: Wei A Suan Pian

### 【成份】

本品主要成份为: 全反式维A酸。其化学名称为: 3,7-二甲基-9-(2,6,6-三甲基环己烯)-2,4,6,8-全反式壬四烯酸。  
结构式:



分子式:  $C_{20}H_{28}O_2$   
分子量: 300.4

【性状】本品为糖衣片, 除去包衣后显黄色。

### 【适应症】

适用于痤疮、扁平苔藓、白斑、毛发红糠疹和面部糠疹等。可作为银屑病、鱼鳞病的辅助治疗, 也可用于治疗多发性寻常疣以及角化异常类的各种皮肤病。同时用于治疗急性早幼粒细胞白血病 (APL), 并可作为维持治疗药物。

【规格】10mg

【用法用量】口服: 每日2~3次, 每次10mg。

### 【不良反应】

(1) 唇炎、黏膜干燥、结膜炎、甲沟炎、脱发。  
(2) 高血脂, 多发生于治疗后2~3个月。  
(3) 引起胚胎发育畸形。  
(4) 肝功能受损。  
(5) 其他: 可出现头痛、头晕 (50岁以下者较老年人多)、骨增厚、口干、脱屑以及对光过敏、皮肤色素变化等。

【禁忌】妊娠妇女: 严重肝肾功能损害者禁用。

### 【注意事项】

口服本品出现不良反应时, 应控制剂量并与谷维酸、VitB<sub>6</sub>、VitE<sub>4</sub>等同服, 可减轻或消失。在治疗严重皮肤病时, 可与皮质激素、抗生素等合并使用, 以增加疗效。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

本品有致畸性, 育龄妇女及配偶在口服本品期间及服药前3个月和服药后1年内应严格避孕, 育龄妇女服药前、停药后应做妊娠实验。

【儿童用药】儿童慎用。

【老年用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物相互作用】本品应避免与维生素A及四环素同服。

【药物过量】内服本品出现不良反应时应控制剂量, 减少使用剂量, 或暂停使用。

### 【药理毒理】

本品为细胞诱导分化药, 维A酸是维生素A的代谢中间体, 主要影响骨的生长与上皮代谢。通过调节表皮细胞的有丝分裂和表皮细胞的更新, 促进正常角化, 影响上皮代谢, 对上皮细胞的生长和角质层的脱落有明显的促进作用, 可促使已有的粉刺去除, 同时又抑制新的粉刺; 可阻止角质栓的堵塞, 对角质蛋白的合成有抑制作用。

### 【药代动力学】

口服吸收良好, 2~3小时血药浓度达峰。吸收后与维生素A在体内的主要代谢产物和活性形式相同, 主要是在葡萄糖醛酸转移酶的催化下生成葡萄糖醛酸代谢物而排出体外, 本品主要在肝脏代谢, 由胆汁和尿中排出。

【贮藏】遮光、密封、在阴凉 (不超过20℃) 干燥处保存。

【包装】铝塑包装, 20片/盒, 60片/盒。

【有效期】24个月

【执行标准】《中国药典》2015年版二部

【批准文号】国药准字H20010487

### 【生产企业】

企业名称: 上海中华药业有限公司  
生产地址: 上海市青浦区新技路685号  
邮政编码: 201707  
电话号码: 021-62815460 400-820-2971  
传真号码: 021-62810882  
网 址: www.zhpharm-sh.com